

19.9.2012

## Ohjeellisia eristysaikoja lasten infektioissa (STM 2005)

Muuten lapsen vointi määrää päivähoitoon palaamisen

Infektio	Eristämisaika
EHEC ja Shigella	Kunnes oireeton ja 2 negatiivista ulostenäytettä
Enterorokko	Ei eristystä
Hengitysteiden virusinfektiot	Ei eristystä
Hepatiitti A	1 viikko oireiden alusta
Hinkuyskä	5 vrk mikrobilääkityksen aloittamisesta
Kihomadot	Ei eristystä
MRSA kantajuus	Ei eristystä
Märkärupi	24 h suun kautta otettavan 48 h paikallisen mikrobilääkityksen aloittamisesta
Ontelosyylät	Ei eristystä
Parvorokko	Ei eristystä
Ripuli	Oireiden ajan
Salmonella, muu kuin S. typhi	Oireiden ajan
Silmätulehdus	Ei eristystä
Streptokokki A –infektiot	24 h mikrobilääkityksen aloittamisesta
Täit ja syyhy	Hoidon ajaksi
Vesirokko	5 vrk rakkuloiden ilmaantumisesta tai kunnes kaikki ruvet ovat kuivia
Välikorvatulehdus	Ei eristystä